

Urologie

Plaatsing van dubbel J-katheter



az Rivierenland

Beste patiënt,

Wat is een dubbel J-katheter?

Een dubbel J-katheter of JJ-katheter is een dun, inwendig slangetje dat in jouw urineleider wordt geplaatst en zo de urineleider goed doorgankelijk houdt. Hierdoor kan de urine van de nieren afvloeien naar de blaas. De dubbel J-katheter dankt zijn naam aan de gekrulde uiteinden die lijken op de vorm van een J. Deze gekrulde uiteinden zorgen ervoor dat de katheter op zijn plaats blijft.

Een geblokkeerde urineafvoer

Onder normale omstandigheden stroomt de urine vanzelf van de nier door de urineleider naar de blaas. De afvoer van de urine naar de blaas kan echter geblokkeerd worden door bijvoorbeeld een steen, druk van buitenaf of een vernauwing van de urineleider. De urine kan er dan niet langs en er ontstaat stuwning van de nier. Dit kan gepaard gaan met kolieklpijnen.

Inbrengen en verwijderen

De dubbel J-katheter wordt ingebracht in de operatiekamer, onder algemene verdoving. Dit gebeurt met behulp van een cystoscoop, meestal onder begeleiding van röntgenbeeld. De katheter kan een aantal weken tot één jaar blijven zitten. De uroloog vertelt je wanneer je de dubbel J-katheter mag laten verwijderen. Het verwijderen gebeurt meestal op de raadpleging urologie met behulp van een flexibele cystoscoop; er wordt hierbij eerst een verdovende gel in het urinekanaal aangebracht. Dit is een korte en weinig belastende handeling.

Alternatief

Soms is het niet mogelijk om een dubbel J-katheter in te brengen of geniet een uitwendige drainageslang (nefrostomie) via de nier de voorkeur. Een voordeel van

een dubbel J-katheter ten opzichte van de nefrostomie is dat het drainageslangetje inwendig zit. Hierdoor is er geen (wond)verzorging nodig.

Nadelen en risico's

Door de aanwezigheid van de dubbel J-katheter kunnen mogelijks volgende klachten ontstaan:

- een pijn- of drukgevoel in de flank en de blaas
- frequente drang om te plassen
- vaak plassen (kleine hoeveelheden)
- een branderig gevoel
- licht bloedverlies bij het plassen
- een drukkend gevoel in de nier tijdens het plassen

Deze klachten kunnen hinderlijk zijn, maar zijn niet alarmerend.

Mogelijke complicaties

Als je koorts ontwikkelt (boven 38,5°C), hevige (koliek)pijn of een zeer hinderlijke drang tot plassen ervaart, neem dan contact op met jouw huisarts of met jouw behandelend arts. Soms wordt er medicatie voorgeschreven om de klachten te verlichten. In uitzonderlijke gevallen is de afvloeï ondanks een dubbel J-katheter onvoldoende en dient er een nefrostomie (drain rechtstreeks van buitenaf in de nier) geplaatst te worden.

Tot slot

Voor vragen of problemen kan je steeds contact opnemen met de urologen of met de verpleegkundigen van de raadpleging urologie via 03 880 91 87. Voor dringende problemen kan je je aanmelden op de dienst spoedgevallen (03 880 95 20).

Mijn notities/vragen:

ref.: 50120970
versie: 19/04/2024
eigenaar: dr. Evelyne Beckers, uroloog
v.u.: Sofie Vermeulen, communicatieverantwoordelijke
www.azrivierenland.be | info@azr.be

Maatschappelijke zetel:
vzw AZ Rivierenland | 's Herenbaan 172, 2840 Rumst
RPR 0416 851 659 | Erkenningsnummer 104 | Bevoegde rechtbank: Antwerpen

CAMPUS RUMST
's Herenbaan 172
2840 Rumst
03 880 90 11