

Pneumologie

Bronchiale provocatie- test



az Rivierenland

Beste patiënt,

Een bronchiale provocatietest is een onderzoek om een verhoogde prikkelbaarheid van de luchtwegen vast te stellen. Hierbij wordt er gebruik gemaakt van histamine of metacholine, een prikkelende maar onschadelijke stof, die een luchtwegvernauwing kan veroorzaken.

De voorbereiding

- Je dient te stoppen met bepaalde medicijnen (zie verder in deze brochure) om de test goed te doen slagen. Je behandelend arts zal je helpen om aan te duiden om welke medicatie het gaat.
- Je hoeft niet nuchter te zijn. Let wel goed op je voeding: de dag van het onderzoek mag je geen koffie, thee, cola of chocolade nuttigen.
- Verwittig je behandelend arts als je kort voor het onderzoek een verkoudheid of bronchitis hebt doorgemaakt.

Het onderzoek zelf

Tijdens het onderzoek zit je op een stoel. Je krijgt een klem op de neus om te voorkomen dat je door jouw neus ademt. Je ademt via een mondstuk dat verbonden is met een meetapparaat. In het begin zal je een paar keer diep moeten inademen en zo krachtig mogelijk uitademen. Daarna krijg je het product histamine of metacholine verneveld. Na iedere inhalatie wordt de longfunctie gemeten. Aan de hand van

de meetresultaten kan worden vastgesteld of er astmatische klachten worden opgewekt. De test is beëindigd als er een bepaalde eindconcentratie van de histamine of metacholine is bereikt of als er een bepaalde reactie in de luchtwegen is opgewekt. Als deze reactie optreedt, dan wordt deze met luchtwegverwijdende medicijnen behandeld.

Je kan een lichte vorm van benauwdheid ervaren tijdens het onderzoek, maar deze verdwijnt van zodra je de luchtwegverwijder hebt ingeademd. Na het onderzoek zijn een lichte keelpijn of prikkelhoest mogelijk. Het onderzoek is belastend omwille van het vele blazen, maar is niet gevaarlijk. Het onderzoek neemt maximum 30 minuten in beslag.

Welke medicatie moet je op voorhand stoppen?

- Ventolin, Salbutamol: te stoppen 8 uur vóór het onderzoek
- Atrovent, Duovent, Combivent, Singulair, Accolate: te stoppen 24 uur vóór het onderzoek
- Serevent, Foradil, Oxis, Formoterol, Formagal, Onbrez, Incruse, Ultibro, Seebri, Anoro, Spiolto, Spiriva, Trimbaw, Trelegy, Xanthium, Theolair: te stoppen 48 uur vóór het onderzoek
- Antihistaminica: te stoppen 72 uur vóór het onderzoek
- Seretide, Symbicort, Inuvair DA, Nexthaler, Flutiform, Relvar, Bufomix: te stoppen 1 week vóór het onderzoek

Wij wensen jou een vlot onderzoek toe!

CAMPUS RUMST

's Herenbaan 172 | 2840 Rumst
03 880 90 11 (algemeen)

CAMPUS BORNEM

Kasteelstraat 23 | 2880 Bornem
03 890 16 11

CAMPUS WILLEBROEK

Tisseltsesteenweg 27 | 2830 Willebroek
03 890 16 11

ref.: 50006436 (B) - 50121127 (R)

versie: 22/03/2021

foto's & illustraties: Adobe stock

eigenaar: dr. Eva Boeykens, pneumoloog campus Bornem

v.u.: Sofie Vermeulen, communicatieverantwoordelijke

Maatschappelijke zetel:

vzw AZ Rivierenland | 's Herenbaan 172 | 2840 Rumst

RPR 0416 851 659 | Erkenningsnummer 104 | Bevoegde rechtbank: Antwerpen

www.azrivierenland.be | info@azr.be

