

IBD (inflammatoire darmziekten) | reumatologie

Starten met Infliximab



Wat is Infliximab (IFX)?

Infliximab is een geneesmiddel dat ontstekingen afremt. Het wordt voorgeschreven voor de behandeling van:

- ziekte van Crohn
- colitis ulcerosa
- psoriasis
- reumatoïde artritis
- spondylitis ankylosans
- psoriatische artritis

Infliximab is een medicament dat behoort tot de groep **TNF-alfablokkers**. TNF-alfa is een eiwit dat een rol speelt bij het ontwikkelen en in stand houden van ontstekingen. Infliximab bindt zich aan dit eiwit en neutraliseert zo de biologische werking.

Opstarten en dosis

Vóór de behandeling met Infliximab kan worden opgestart wordt er eerst gescreend op actieve of inactieve tuberculose. Dit gebeurt met een röntgenfoto van de longen, een tuberculine huidtest en een bloedafname.

Infliximab wordt toegediend via een infuus. De dosering wordt uitgerekend aan de hand van het lichaamsgewicht.

Bij het starten van de behandeling wordt het infuus toegediend op week 0, op week 2 en op week 6 en dit gedurende 2 uur. Vanaf het 4^{de} infuus gebeurt dit om de 6 of 8 weken gedurende 1 uur indien goed verdragen (onderhoudsbehandeling).

Wat is het effect met deze behandeling?

Bij toediening voor IBD

Tot bij 80% van de patiënten treedt er een duidelijke verbetering op van de klachten binnen de 3 tot 7 dagen na het geven van het infuus. Ongeveer 6 op 10 van de patiënten zijn zelfs volledig klachtenvrij nadien, met vaak een volledige genezing van het darmslijmvlies na enkele maanden. Dit is geen definitieve genezing omdat het geneesmiddel gemiddeld 8 weken werkt, waarna de klachten kunnen terugkomen. Daarom wordt Infliximab steeds verdergezet indien er een goede respons is.

Bij toediening voor reumatologische klachten

Tot bij 80% van de patiënten treedt er een duidelijke verbetering op van de klachten binnen de 3 tot 7 dagen na het geven van het infuus. Ongeveer 6 op 10 van de patiënten zijn zelfs volledig klachtenvrij nadien. Dit is geen definitieve genezing omdat het gemiddeld 8 weken werkt, waarna de klachten kunnen terugkomen. Daarom wordt Infliximab steeds verder gezet indien er een goede respons is.

Mogelijke nevenwerkingen

Zeldzaam kunnen tijdens of onmiddellijk na het infuus volgende bijwerkingen optreden: hoofd- en spierpijn, duizeligheid en lage bloeddruk.

Verwittig onmiddellijk de verpleegkundige wanneer je je onwel begint te voelen tijdens de toediening. Patiënten die behandeld worden met Infliximab hebben een licht verhoogde gevoeligheid voor infecties. Controleer jouw temperatuur wanneer je je ziek voelt of andere tekenen van infectie (bv. etterend wondje) vertoont.

Het gebruik van Infliximab kan leiden tot huiduitslag. Meestal gebeurt dit na meerdere behandelingen. De huiduitslag kan tijdens de toediening optreden, maar ook als je weer thuis bent. Meld deze reactie aan je arts. Soms kunnen de allergische reacties behandeld worden met anti-allergiemiddelen. Zelden is het nodig de behandeling te stoppen.

Zwangerschap en borstvoeding

Bij een mogelijke zwangerschap (swens) dien je contact op te nemen met je behandelend arts. Het al dan niet verderzetten van Infliximab tijdens zwangerschap en borstvoeding wordt per patiënt individueel bekeken en besproken met de arts. Meestal (zo mogelijk) wordt Infliximab vermeden in het 3^e trimester van de zwangerschap.

Praktische informatie

Eerste infusie op / /
om uur

Neem contact op indien je niet aanwezig kan zijn op de gemaakte afspraak.

Je hoeft niet nuchter te zijn, tenzij je arts dit gevraagd heeft. Tijdens de infusiebehandeling mag je de infuuseenheid niet verlaten. Breng gerust iets mee om te lezen of te werken. Je kan ook wat rusten en praten met de andere patiënten. Draag best comfortabele kledij.

In normale omstandigheden kan je na de behandeling zelf naar huis rijden.

Heb je nog vragen?

Neem contact op met onze
IBD-verpleegkundigen.
Ze zijn er om jou te helpen!

Contact

campus Bornem

IBD-verpleegkundig consulente

Veroniek Vandewalle
03 890 59 27 | route 40
veroniek.vandewalle@azr.be

IBD-artsen

dr. Michiel Schils
dr. Gaëtan Van den Steen

Dagziekenhuis geneeskunde

campus Bornem: 03 890 17 43

Verpleegafdeling geneeskunde 2

campus Bornem: 03 890 16 45

Verpleegafdeling chirurgie

campus Bornem: 03 890 16 65

campus Rumst

IBD-verpleegkundig consulenten

Valerie Rosiers en Gazal Dikeç
03 880 99 90 | route 77c
ibd.rumst@azr.be

IBD-artsen

dr. Ludwig Marchal
dr. Geert Van de Vyver

Dagziekenhuis geneeskunde

campus Rumst: 03 880 96 99

ref.: 50006181 (B) - 50121130 (R)

versie: 08/04/2024

foto's & illustraties: Adobe stock

eigenaar: Veroniek Vandewalle, IBD-verpleegkundig consulente

v.u.: Sofie Vermeulen, communicatieverantwoordelijke

Maatschappelijke zetel:

vzw AZ Rivierenland | 's Herenbaan 172 | 2840 Rumst

RPR 0416 851 659 | Erkenningsnummer 104 | Bevoegde rechtbank: Antwerpen

www.azrivierenland.be | info@azr.be